

kogusaak tõusis 1933. a. 9 490 000 kv-le eelmise aasta 7 827 887 kv. vastu, suurenedes 21,2%. Parema saagi põhjustasid kasvutingimused. Harilikult on küll Põhja-Eestis kartulisaagid paremad kui Lõuna-Eestis, kuid 1933. a. osutus kartulisaak paremaks Kesk-Eestis. Keskmise saak ha-lt 13 882 kg eelmise aasta 11 686 kv. vastu, tõus 18,8%.

Söödajuurikate kasvatamine on üldse veel vähe levinud ja näitab langust. Möödunud aastal langes söödajuurikate kasvupind 2,4% võrra, vähenedes 7640 ha-le eelm. aasta 7827 ha-lt. Juurviljakasvatus on levinud kõige rohkem Kesk-Eestis piimakarjapidamise valdkonnas. Keskmise juurvilja-saak ha-lt oli Viljandimaal 27 080 kg, Petserimaal 14 043 kg ja Võrumaal 14 040 kg. Juurvilja kogusaak oli 1933. a. 1 538 820 kv. l. a. 1 697 346 kv. ja 1925.—1929. a. keskmise 1 260 627 kv. vastu. Mullusele saagile avaldas halvavat mõju suvine põud.

Juurvilja kasvupind ja saak:

	K a r t u l			S ö ö d a j u u r i k a d		
	kasvupind ha	kogusaak kvintaalides	keskmiselt kg ha-lt	kasvupind ha	kogusaak kvintaalides	keskmiselt kg ha-lt
1933 . . .	68 367	9 490 440	13 882	7 640	1 538 820	20 142
1932 . . .	66 984	7 827 887	11 686	7 827	1 697 346	21 686
1931 . . .	67 810	8 545 316	12 602	8 118	1 678 421	20 675
1930 . . .	68 039	8 631 100	12 686	8 073	1 632 000	20 216
1925—29	67 219	7 143 506	10 627	6 514	1 260 627	19 352
	% (1925—1929 = 100).					
1933 . . .	101,7	132,9	130,6	117,3	122,1	104,1
1932 . . .	99,7	109,6	110,0	120,2	134,6	112,1
1931 . . .	100,9	119,6	118,6	124,6	133,1	106,8
1930 . . .	101,2	120,8	119,4	123,9	129,5	104,5