

Lina kasvupind suurenes 13,3% võrra, tõustes 14 659 ha-lt 16 610 ha-le, kuid on siiski rohkem kui pool madalam 1925.—1929. a. keskmisest kasvupinnast, s. o. 36 110 ha-st. Ent kiu kogusaak ületas 1933. aastal 1932. aasta saagi, andes 51 571 kv. eelmise aasta 38 325 kv. vastu.

Heinasaak osutus madalamaks kui aasta varemalt. Saagi vähenemist põhjustasid peamiselt ilmastikuolud, mis osutusid heinakasvule ebasoodsaks. Kevadel püsisid kaua vilud ilmad, ja pärast valitses põud. Põlluheina niitepind oli 1933. a. 172 921 ha l. a. 173 350 ha vastu. Niiduheina kogusaak vähenes 15%, põlluheina kogusaak läks tagasi 8% võrra.

Heina niitepind ja saak:

	P õ l l u h e i n			N i i d u h e i n		
	niitepind ha	kogusaak kvintaalides	keskmiselt kg ha-lt	niitepind ha	kogusaak kvintaalides	keskmiselt kg ha-lt
1933 . .	172 921	4 134 663	2 391	911 668	7 366 677	808
1932 . .	173 350	4 496 939	2 594	909 207	8 659 988	952
1931 . .	174 170	5 068 764	2 910	909 841	8 964 880	985
1930 . .	166 686	5 782 783	3 469	909 462	7 756 026	853
1925—29	143 332	4 295 901	2 997	877 790	8 548 537	973
	% (1925—1929 = 100)					
1933 . .	120,6	96,2	79,8	103,9	86,2	83,0
1932 . .	120,9	104,7	86,6	103,6	101,4	97,8
1931 . .	121,5	118,0	97,1	103,7	104,9	101,2
1930 . .	116,3	134,6	115,7	103,6	90,8	87,7

Kokkuvõttes möödunud aasta viljakasvatuse tulemusi võib pidada kõigiti rahuldavaiks, peale loomasaadade, mille saak ikaldas põua tagajärjel. Looma-