

Idigatakse peenikeseks ja keedetakse kasina weega kord ära, walatakse kahe kopiku ehk ka kolme eest wiina (karakast) pääle, liigutatakse sojalt ümber ja pannakse siis seda segi haawa pääle. See on kõige parem rohi.

Kui haawa sees üks ja teine kond wigafeks saanud, siis peab inimene ennast pikkema aea pääle arsti wõi tohtre hooleks andma; sest sinna läheb enam arstimist tarwis, kui siin ette õõlda tohime.

Meljandaks: muljutud ehk õerutud haawad. Niisuguste haawade pääle pannakse kolmel esimestel päawadel kummeli rohtu piimaga keedetud ja pärast seda siis esiteks rohelist plaastert.

Wiendaks: hullu koera hammustamisest. Seda haawa peab lastma hästi werd jooksta, sibulast ja mädarõigast pääle panema. Parem on, kui niisuguse haawa pääle kuppukohe lastakse, ja et kupu sarwed hästi kangeste kisuwad. Veel parem on see, kui haawa tulise rauaga wälja põletatakse. Aga

arsti juurest peab ka siiski ikka rutuste abi otsitama, kes asja paremine tunneb, kui muu teine. — Kui koer ka küll mitte hull poleks olnud, waid muidu wihaga inimest kiskunud, on niisugune haaw ikka enam karta, kui muu teine. Sellepärast peab wihase koera hammustatud haawa pääle sibulast pandama, ja lastakse esite mada jooksta, enne kui teda plaastrega parandama hakatakse.

Kuuendaks: wana haawadest. Kui niisugune haaw isienest on sündinud ja juba liig wanaks saanud, siis on ikka arsti rohtusi tarwis pruukida, sest et niisugust wana wigaga üksi seesuguste rohudega parandatud wõib saada, mis sisse antakse. Aga siis, kui haaw wäga walutab, wõib ka piimaga keedetud rohtusi nartsuga pääle panna; aga kui haaw wäga palju mada jookseb, siis peab piimaga keedetud raudreia rohtu pääle panna. — Ja kui niisuguse haawast punane wesi wälja jookseb, mis kangeste haiseb, siis keedetakse porikandi juured piimaga pudruks ja pannakse seda pääle. Aga haigele peab ikka kinnitatud