
sellal kui selgete, vinavate ja pilviste päevade[1]) võimaluse ja keskmist aastast käiku näitab Tartu Meteoroloogia-observatooriumi diagramm (vt. 164. joon.) ning tabel XXV:



164. joon. Selgete, vinavate ja pilvis päevade võimaluse aastane käik Tartus (1866—1915).

Le nombre des jours clairs et nuageux. L'axe horizontal indique les mois, l'axe vertical le nombre des jours (en %) de tomps clair, couvert et nuageux.

Rõht-teljel kuud, püst-teljel selgete, vinavate ja pilvis päevade võimalus %-des.

Aritmogramm-tabel XXV.

Variation annuelle du nombre des jours de temps clair, couverts et nuageux.

	S	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
selged	33,8	1,7	2,7	**3,9**	**4,6**	2,9	**4,0**	**3,6**	**3,0**	2,8	2,3	0,9	1,4
vinavad	154,5	7,9	9,1	10,5	**13,5**	**17,0**	**17,5**	**18,0**	**17,9**	**15,6**	14,9	7,7	6,9
pilvis	176,7	**21,4**	**16,2**	**15,6**	11,9	11,1	8,5	9,4	10,1	11,6	**16,8**	**21,4**	**22,7**

Analüüsime lähemalt pilvituse isetüüpe, millest suuresti oleneb nii taevalaotus linna kohal kui ka linnas endas valitsev varju ja valguse vaheldus, siis saame järgmise pildi (vt. aritmogramm-tabelid XXVI—XXXI):

1) Võrdluseks olgu toodud Tartuga ühte ja samasse päikesepaiste kestuse vahemikku (1500 kuni 1750 tundi aastas) kuuluv Breemen, kus 1876.—1915. aastakeskmiselt oli 28,4 selget, 135,8 pilvist ning 198,1 vinavat päeva; järelikult valitseb seal meretüüp veel tüübilisemalt.