

Aritmogramm - tabel XLIII.

Variation annuelle de la fréquence des journées de givre (1870—1915). Chaque "—" indique une journée.

	<u>0,6</u>	<u>0,9</u>	<u>0,3</u>	<u>0,2</u>	0,8	0,0	0,0	<u>0,6</u>	<u>0,8</u>	<u>0,5</u>	<u>0,6</u>	
I	—	—	—	—	0,8	0,0	0,0	—	—	—	—	A
2,6	2,9	3,3	3,2	0,8	0,0	—	0,0	1,6	4,8	2,5	2,6	24,3

Keskm. hallapäevade arv Tartus (1870—1915) (iga "—" tähendab 1 päeva).

Aritmogramm - tabel XLIV.

Variation annuelle de la fréquence des journées de rosée (1866—1915). Chaque "—" indique une journée.

	<u>0,5</u>	<u>0,1</u>	<u>0,5</u>	—	<u>0,6</u>	<u>0,9</u>	—	—	—	<u>0,4</u>	—	0,3	
I	—	—	—	0,5	1,1	1,5	3,0	7,6	7,9	3,4	0,3	0,0	A
—	—	—	—	0,5	1,1	1,5	3,0	7,6	7,9	3,4	0,3	0,0	25,3

Keskm. kastepäevade arv (1866—1915) kuude kaupa aasta kestel Tartus (iga "—" tähendab 1 päeva).

Aritmogramm - tabel XLV.

Variation annuelle de la fréquence de la pluie : le nombre moyen des jours de pluie (1866—1915). Chaque "—" indique 5 jours.

	<u>2,9</u>	<u>4,7</u>	<u>4,5</u>	<u>2,6</u>	<u>3,8</u>	<u>2,3</u>	<u>4,8</u>	<u>1,4</u>	<u>0,3</u>	<u>0,9</u>	<u>3,8</u>	<u>4,0</u>	
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A
17,9	14,7	14,5	12,6	13,8	12,3	14,8	16,4	15,3	15,9	18,8	19,0	—	

Sademepäevade keskmine arv (1866—1915) Tartus (iga "—" tähendab 5 päeva).

Aritmogramm - tabel XLVI.

Quantité moyenne des condensations atmosphériques diurnes. Chaque "—" indique 1 mm.

	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>0,9</u>	<u>0,4</u>	<u>0,4</u>	<u>0,9</u>	<u>0,7</u>	<u>0,8</u>	<u>0,7</u>	<u>—</u>	<u>0,4</u>	<u>0,3</u>	
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A
2,0	2,0	1,9	2,4	3,4	4,9	5,7	4,8	3,7	3,0	2,4	2,3	—	

Sademete keskm. hulk sademepäeval (iga "—" tähendab 1 mm).

Siiski on sademed keskkonnas suvekuil kõige vähem tunduvad, sest peale sademe-päevade võrdleva vähesuse on ka sademetundide keskmine arv sademepäeval mai ja augusti vahemikus vähim (vt. aritmogr. XLVII), nii et suviseid sademeid ise-loomustab lühikesse aja jooksul suur mahalangev hulk (vt. aritmogramm XLVIII), mis on eriti rohkem äkildasil suviseil äikesevihma-sagarail. Sellele viitab ilmselt kõuepäevade võrdlemisi sage, aga ka CuNb ainuüksi esinemine suve-poolaastal — (vt. aritmogrammid XXXI ja XLIX).