

43. järg.	Veeurimise aeg	Füsikaalsed omadused	Temperat. (C) vee- proovi võtm. juures	Kuiv jääus kuivat. 110° C juures	Keemilised omadused								Bakterioloogil. andmed				
					Kloor (Cl) mg 1 liitris	Amoniaak (NH ₃) mg 1 l.	Salpeetrishape (N ₂ O ₃) mg 1 l.	Uldkaredus saksakraadides	Kaltsiumhapend (CaO) mg 1 l.	Magn.-hapend (MgO) mg 1 l.	Hapendumus (O ₂) mg 1 liitris	Raudhapend (Fe ₂ O ₃) mg 1 l.	Alum.-hapend (Al ₂ O ₃) mg 1 l.	Ränihapend (SiO ₂) mg 1 l.	Mikroobide pesade (koloo- niate) arv 1 cm ³ vees	Agar- söötmeel	Coli- tiiter
4. Puistee 60/62 kaev	5. 3. 1927	Selge, natuke sadet	...	940	46	0	0	32,9	293	25,9	2,2	jäljed	10,8	10,0	42	—	50 cm ³ 0
	18. 6. 1927	Natuke sadet	7	640	48	jäljed	0	28,4	220	59,0	3,6	0	4,8	—	52	—	50 cm ³ +
	6. 8. 1927	"	8	650	50	0,1	0	27,8	240	36,0	4,9	1	1,2	—	60	15	50 cm ³ 0
	12. 11. 1927	Selge	6,5	480	38	0	0	28,2	245	35,0	3,8	0	1,7	—	130	—	1 cm ³ +
	2. 3. 1928	Natuke sadet	5,5	598	34	0	0	31,2	238	72,0	3,7	0	7,0	2,7	11	—	125 cm ³ 0
	30. 5. 1928	Selge, sademetu	6,5	790	54	0,3	0	28,0	214	49,0	3,3	0	2,4	3,0	450	6	100 cm ³ +
	4. 8. 1928	" natuke sadet	7,5	760	44	0,1	0	31,9	268	36,8	3,3	0	6,0	14,0	157	8	100 cm ³ +
	19. 5. 1930	" sade ¹⁾	...	554	30	jäljed	0,003	20,4	145,3	41,8	2,8	0	—	—	—	—	—
	5. 3. 1927	Selge, natuke sadet	...	1960	234	jäljed	0,1	34,2	316	25,2	4,9	jäljed	7,2	20,0	236	—	25 cm ³ +
	18. 6. 1927	Natuke sadet	7	2320	248	0,1	0,2	32,4	258	64,0	6,0	jäljed	3,0	1,4	136	—	50 cm ³ 0
5. Peetri 30/36 kaev	6. 8. 1927	Palju	7,5	2000	218	0,05	0,1	31,1	241	67,0	6,8	0	3,6	—	318	130	50 cm ³ 0
	12. 11. 1927	"	7	1640	224	0	jäljed	42,8	360	65,0	3,5	2,0	3,5	—	110	—	10 cm ³ +
	2. 3. 1928	"	6,5	1092	245	0	"	47,8	380	96,0	4,5	0	8,3	8,2	112	—	125 cm ³ 0
	30. 5. 1928	Natuke "halb maitse	6	1710	224	0	0,4	43,5	344	65,0	4,8	0	6,3	3,2	120	5	10 cm ³ +
	4. 8. 1928	Sade, halb maitse	7,5	1844	246	0,1	0,05	43,5	365	49,2	5,2	2	4,4	9,6	274	97	25 cm ³ +
	19. 5. 1930	Selge, sade ²⁾	...	1864,2	245	jäljed	0,01	48,4	368,7	82,5	3,8	0	—	—	—	—	—
	5. 3. 1927	Selge, maitse häa	...	438	20	0	0	20,8	186	16,1	1,5	0	3,6	8,0	162	—	50 cm ³ 0
	18. 6. 1927	"	6,5	600	22	0	0	18,7	128	56,8	1,4	0	6,2	8,8	178	—	50 cm ³ 0
	6. 8. 1927	"	7	425	22	0	0	16,8	131	35,0	2,0	0	1,8	—	168	40	—
	12. 11. 1927	"	5	432	20	0	jäljed	17,2	136	34,7	1,5	0	1,6	—	120	—	100 cm ³ +
6. Meltsiallikas	2. 3. 1928	"	5	386	19	0	0	21,3	140	62,5	1,6	0	13,0	8,0	2	—	125 cm ³ 0
	3. 5. 1928	"	6,5	382	20	0	0	16,7	120	33,3	1,7	0	4,3	2,4	5	—	115 cm ³ 0
	4. 8. 1928	"	6	410	20	0	0	19,7	152	32,6	4,4	0	2,4	15,4	76	3	100 cm ³ +
	16. 5. 1930	"	...	393,8	18	0	0	17,7	124,8	37,4	1,4	0	—	—	—	—	—
	5. 3. 1927	Selge, maitse häa	...	438	20	0	0	20,8	186	16,1	1,5	0	3,6	8,0	162	—	50 cm ³ 0
	18. 6. 1927	"	6,5	600	22	0	0	18,7	128	56,8	1,4	0	6,2	8,8	178	—	50 cm ³ 0

Kõik uuritud kaevud on sahtli tüüpi, järgmise sügavusega: 1. — 14,77 m, 2. — 20,66 m, 3. — 17,73 m, 4. — 15,97 m, 5. — 18,10 m.
Vee kihi kaugus maapinnast: 1. — 14,45 m, 2. — 18,64 m, 3. — 16,23 m, 4. — 15,46 m, 5. — 16,99 m.

- 1) Kuiv jääk päale kuumutamist 259,6 mg, kadu kuumutamisel 294,4 mg; N₂O₅ 74,5 mg.
- 2) Kuiv jääk päale kuumutamist 1348,4 mg, kadu kuumutamisel 515,8 mg; N₂O₅ 250 mg.
- 3) Kuiv jääk päale kuumutamist 245,4 mg, kadu kuumutamisel 148,4 mg; N₂O₅ 15,1 mg.