kõlbmata liha müümine — 22, keelatud viisil saiadega kauplemine — 32, kodus loomade tapmine — 11, keelatud viisil ja ajal kauplemine — 25, hoovide ja käimlate mustus — 17, arstlikul läbivaatusel mittekäimine — 49, muud mitmesugused põhjused — 218 protokolli.

Võrreldes arvulisi andmeid eelmise aasta arvudega, selgub, et piimasaaduste alal on 1937./38. aastal proove märksa rohkem võetud. Sellepärast suurenes ka vastutusele võetud isikute arv. Keelatud viisil saiadega kauplemine on jäänud endisest vähemaks. Osa sel alal tegutsenud naisi on sellest ärist hoopis loobunud ja osa on läinud üle teistele tegevusaladele.

Aasta jooksul ilmunud määrustest puudutab tervishoiupolitsei tegevusala Kanamunade kaubandusliku liigitamise määrus (RT nr. 31 — 1938), mis seab kanamunade müügi siseturul kindla korra raamidesse. Määruse alusel jagunevad müügiletoodavad munad liikidesse ja valikutesse. Ka nõuab määrus, et müüdavad kanamunad oleksid puhtad, mis on eriti tervitatav. Paljudes välisriikides oli see nõudmine juba ammu ellu viidud. Kohalikkudest määrustest võiks veel nimetada Linna Tapamaja sisekorra määrust (RT nr. 49 — 1937). Tervishoiupolitsei tegevust puudutab see niipalju, et valve selle määruse täitmise üle on pandud Tapamaja juures töötava tervishoiupolitsei ametniku peale.

VÕITLUS NAKKUSHAIGUSTEGA.

Linnavolikogu omal koosolekul 31. mail 1937 võttis vastu sundmääruse nakkushaiguste vastu võitlemise kohta Tartu linnas (RT nr. 72 — 1937).

Sundmäärus korraldab ja määrab tarvitusele võetavad abinõud ägedatesse nakkushaigustesse haigestumise kindlakstegemise ja nende haiguste levimise tõkestamise kohta.

Nendeks haigusteks on: katk *(pestis)*, koolera *(cholera asiatica)*, rõuged *(variola)*, verine kõhutõbi *(dysenteria)*, kõhusoetõbi *(typhus abdominalis)*, paratüüfus *(paratyphus)*, tähniline soetõbi *(typhus exanthematicus)*, korduv soetõbi *(typhus recurrens)*, sarlakid *(scarlatina)*, difteeria *(diphteria)*, epideemiline ajupõletik *(meningitis cerebrospinalis epidemica)*, laste halvatustõbi *(poliomyelitis anterior acuta)*, leetrid *(morbilli)* ja läkaköha *(pertussis)*.

Suuremal arvul esines 1937. a. sarlakeid ja difteeriat, kuid suurenenud oli ka kõhutüüfusse haigestumine (1936. a. — 20 juhtu, neist

Tartu VI, lk. 63