2 surmajuhtu; 1937. a. — 58 juhtu, neist 9 surmajuhtu). Siinjuures peab aga meeles pidama, et kõhutüüfuse esinemine oli 1936. a. madalam kui kunagi varem iseseisvuse-aja kestel. Tüüfuse haiguspesade epidemioloogilist uurimist toimetati samadel alustel kui eelmistelgi aastatel. Tüüfus esines üksikute haiguspesadena, tõenäoliselt toiduainete, eriti piima kaudu levitatuna. Tüüfust põdenud ja haiglast paranenutena lahkunud isikute suhtes teostati rooja ja uriini uurimist, kusjuures pisikuid eritajad on Tervishoiuosakonna kontrolli all, kes aeg-ajalt korraldab nende bakterioloogilist uurimist.

15. Tartus registreeritud nakkushaigused.

Maladies contagieuses enregistrées.

	1934	1935	1936	1937
Kõhutüüfus — *Typhus abd.*	103	88	20	58
Paratüüfus — *Paratyphus*	40	36	25	30
Leetrid — *Morbilli*	788	372	2	2
Sarlakid — *Scarlatina*	156	119	155	221
Difteeria — *Diphteria*	67	78	64	149
Epideemiline meningiit — *Meningitis epid.*	3	1	—	2
Pidalitõbi — *Lepra*	2	—	—	—

Õpilaste seas esines 1937. aastal eelmisest aastast suuremal määral sarlakeid (1936. a. — 155 juhtu ja 1 surmajuht; 1937. a. — 221 juhtu ja 1 surmajuht) ja difteeriat (1936. a. — 64 juhtu ja 4 surmajuhtu; 1937. a. — 149 juhtu ja 6 surmajuhtu).

Sarlakite suuremat levimist 1937. a. soodustas haiguse võrdlemisi kergekujuline iseloom, mistõttu paljud lapsed põdesid selle läbi voodisse heitmata ning tervete seas liikudes.

Suurem sarlakitesse haigestunute arv oli detsembrikuus, mis sundis tõkkeabinõuna keelama õpilaste ja lasteaedade jõulupuude ning laste teatri- ja kinoetenduste korraldamise. Viimane abinõu aitas tunduvalt kaasa sarlakite vähenemisele 1938. a. alguskuudel.

Difteeria esines peamiselt algkooles, eriti Kesk tänaval asuvas algkoolis. Viimases kui ka teistes koolides võeti tarvitusele kõik abinõud haiguse piiramiseks ja likvideerimiseks.

Tervishoiuosakonna desinfektori poolt toimetati 1937. a. üldse 410 desinfitseerimist nakkushaiguste puhul, neist linnas 351 ja maal 59 juhul.

Tartu VI, lk. 64